


MANEJO DURANTE EL PARTO

El parto de las cabras suele durar entre 1 a 2 horas, y puede variar de acuerdo a la cantidad de crías, tamaño de crías, edad y estado de la madre.



- Procurar que el parto se complete en forma natural.
- Intervenir solo si la cría presenta dificultades que impiden o retrasan la expulsión normal. En tal caso, corregir cuidadosamente su posición para facilitar el nacimiento.



Después de la primera cría, esperar 30 minutos y revisar si hay más crías por nacer. Evitar el ingreso de otros animales al corral de parición, incluso de personas extrañas sin previa desinfección.

MANEJO DESPUÉS DEL PARTO



Observar si la cabra se acerca a su cría; si lo lame, lo limpia y la trata de levantar.

Si luego de dos horas no ha expulsado la placenta, se debe aplicar tratamiento con oxitocina. Realizar este procedimiento bajo la supervisión de un profesional.

Si la cabra ha parido en el campo, se recomienda no dejarla sola, pues siempre existe el peligro de que sea atacada por depredadores.



Si la madre no acepta a su cría, deben permanecer juntas en un corral pequeño por lo menos dos días para favorecer el vínculo.



Asegurarse que la cría consuma calostro dentro de los primeros 30 minutos después del parto.

"Este documento incluye elementos gráficos generados con apoyo de herramientas informáticas de generación automática de imagen a partir de texto, revisados y validados por el equipo técnico" "Gráfico elaborado con apoyo de herramientas informáticas de generación automática y validado por el equipo técnico"

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS

MANEJO DE LA CABRA
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO

Primera edición: Julio, 2026
Publicado: Julio, 2026
Tiraje: 1000

Editado por: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Equipo Técnico de Edición y Publicaciones Av. La Molina 1981, Lima-Perú

Teléfono: (511) 240-2400
www.gob.pe/inia

Equipo Técnico de Edición y Publicaciones: Janet Flores /
Teléfono: 964173509 / Correo electrónico:
comite_publicaciones@inia.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este tríptico por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2026-08765

Elaborado por: José E. Domínguez-Peña / Edición general: David J. Godoy-Padilla / Revisión de contenido: Ayrton E. Bautista-Reynoso / Diseño y diagramación: Rolando Vargas-Valencia

Impreso en: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA / RUC: 20131365994 / Dirección: Av. La Molina 1981, La Molina - Lima - Perú / Correo electrónico: comite_publicaciones@inia.gob.pe

f X @ + in @INIAPeru



MANEJO DE LA CABRA

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO

CUI: 2506684

CICLO REPRODUCTIVO DE LA CABRA

La pubertad es el periodo en el que los animales alcanzan la madurez sexual. En las cabras, este proceso se manifiesta con la aparición del primer celo.



La madurez sexual está influenciada por la alimentación, condiciones ambientales y raza del animal.



Edad óptima al primer servicio: 10 a 14 meses o cuando la cabra alcanza un peso corporal de 30 a 35 kg.

El estro o celo en cabras dura aproximadamente 24 a 36 horas.

Duración promedio de la gestación: Aproximadamente 5 meses (150 días). Pueden tener de 1 a 4 crías por parto.



CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UNA CABRA PRODUCTORA


I Buenos aplomos.

II


Ubres bien conformadas, correctamente insertadas y libres de lesiones o alteraciones visibles.

III

Una conformación corporal equilibrada (condición corporal entre 2 y 3). Ni muy gordas, ni muy flacas.



MANEJO ANTES DEL PARTO



- Las cabras deben estar en corrales amplios, exclusivos para la gestación y partos con dimensiones de 2 a 2,5 m² por animal.

- Los corrales deben tener comederos y bebederos a disposición.

Separar a los animales agresivos para evitar peleas y posibles abortos en los corrales.

IMPORTANTE

Aplicar **vitamina A, D, E y complejo B**.



Hay un incremento del crecimiento del feto, mayor desarrollo de la glándula mamaria y mayor producción de calostro.

50
días
antes
del parto

(último tercio de gestación)

Determinante en el peso al nacimiento, sobrevivencia y en el desarrollo de las primeras horas de vida después del nacimiento.

En esta etapa es necesario suministrar suplementos minerales como calcio, fósforo, cobalto y sodio. Los puedes conseguir en cualquier centro agropecuario o centro veterinario.




El 90% de la muerte de cabritos se debe al bajo peso con el que nacen y porque no consumen el calostro durante las primeras horas de vida.

Por ello, la cabra necesita mayor cantidad de alimento y de buena calidad para evitar abortos, malformaciones genéticas, retención de placenta y presencia de partos difíciles.



Evitar la acumulación de heces en los corrales, con el fin de reducir la proliferación de patógenos y mantener condiciones sanitarias adecuadas para los animales.



Los corrales deben tener un buen drenaje para evitar problemas de pedería. Realizar el recorte de pezuñas para evitar este problema.

Al tercer mes de preñez, se deben secar las cabras para facilitar la recuperación de la glándula mamaria y estimular mayor producción de calostro para las crías.



RECUERDA

Alimentar con insumos proteicos y energéticos; éstos son muy importantes para tener crías fuertes y sanas.

